

การนำเอกภุมจุลินทรีย์ไปใช้ในการปลูกลำไย ระยะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ส.ค. – พ.ย.)

1. ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต (ส.ค. – พ.ย.)

- ตัดแต่งกิ่ง โดยเลือกแต่งกิ่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คือ กิ่งกระโคง กิ่งในทรงพุ่ม กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ กิ่งขนานกับพื้น กิ่งชี้ลงดิน เลือกกิ่งที่ทำมุม 45 องศากับลำตัวไว้โดยแยกการตัดแต่ง กิ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือ เดือนสิงหาคม 1 ครั้ง ตุลาคม 1 ครั้ง พฤศจิกายน 1 ครั้ง

- ใส่ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ MMO โดยหว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 2 กำมือต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร คลุมด้วยปุ๋ยหมักจุลินทรีย์จากอินทรีย์วัตถุในท้องถิ่น รดน้ำ ผสมจุลินทรีย์ MMO อัตราส่วน 1 – 2 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร อย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งจนถึงเดือนตุลาคม จึงหยุดการให้ปุ๋ย

- พ่นจุลินทรีย์ MMO หมักขับไล่แมลง 15 วัน/ครั้ง อย่างต่อเนื่อง

2. ระยะแทงช่อดอก (ธ.ค. – เม.ย.)

- พ่นฮอร์โมนผลไม้สุกอย่างต่อเนื่อง 15 วัน/ครั้ง จนถึงระยะลำไยติดผลเท่าหัวไม้ขีด

- พ่นจุลินทรีย์ MMO หมักป้องกันโรคและแมลง 15 วัน/ครั้ง

- เริ่มใส่ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์เมื่อแทงช่อดอกตามอัตราส่วนและระยะเวลาเดิม

- ให้น้ำผสม MMO ขยาย 1 – 2 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ประมาณ 10 % สัปดาห์ละครั้ง

3. ระยะให้ผลผลิต (พ.ค. – ส.ค.)

- พ่นสารสกัดชีวภาพจากหอยเชอร์รี่อย่างต่อเนื่อง 15 วัน/ครั้ง จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

- พ่นจุลินทรีย์หมักป้องกันโรคและแมลงอย่างต่อเนื่อง 15 วัน/ครั้ง

- ใส่ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ – อินทรีย์วัตถุเดือนละครั้ง

- ให้น้ำผสมจุลินทรีย์ MMO ขยาย 1 – 2 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร ประมาณ 50 % (กรณีที่ฝน

ไม่ตก)

4. เก็บเกี่ยวผลผลิต (ก.ค. – ส.ค.)

- ควรใช้กรรไกรตัดพวงลำไยแทนการหักกิ่ง จะทำให้การแตกช่อของลำไยในปีต่อไป เป็นพวงสวยงามและกระจายทั่วทรงพุ่ม